
ulantumbantumbantumbuntumb Paradisa 1344Mtp2 Vass7R11s521-525 Collection Vassal-Montpellier Paradisa 10 Rq 0 - 531-535









ANNEE: 1994

MOM Paradisa

1344,02 EMPLACEMENT 10 R9 1531.535

				,								
ouche	Nbre	Débou	rrement			Floraison			Véraison			Madeumi Lá
Duche	уечх	début	mi/déb			debut	mi/f	fin	début	mi/v	fin	Maturit é
1 A 2 3 A	2	3,3	7.3×	0	Crappe				•	Compa	cité	: L - M -C
4 & 5 %	le 7	. 3 . 34	(0)		Pour: Baie: TG - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur: R-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - colo Saveur: s - m - ar - fox - herb Pépins: avec - apyrène Port: Vigueur:							oloré

ANNET: 1995 NOM Paradisa

EMPLACEMENT NO R 9 A 534, 535

U	1344.	02										
Souche	Wbre yeux		rrement mi/déb						Véraison début mi/v fin Maturité			
1 }	3	16 3	20.3*	2	7		Also de	confie	1			
3/8	Dle	20.3.	35 (+3)		Pour : Baie : Couleu Saveur	TC - 0 disc-si r: B-0 : s - : avec	Milg - M ph-ell Gr-Rs- m - a c - ap	1: - P I -ov-ol Rg-N r - fo	Dim: bov-cy:	l-fus : inc -		: L - N- C

Shre yeux debut mi/deb grap lite debut mi/f fin debut mi/v fin naturate 1	AMNEEL: 1996 HOM Paradisa EMPLACEMENT No R 9 1 531 .535 1344.02												
Grappe: G-M-P Dim: Compacité: L-H-C Four: Mill: Raie: TC-G-M-P Dim: Gisc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N dus: inc-coloré Saveur: s-m-ar-fox-herb Pépins: avec-apyrène	iche		Débou début	irrement mi/déb	Phile grap	Ferti- lits	Ferti- Floraison Véraison Lité début mi/F fin début mi/V fin Datur						
Fort: Vigueur:	2 3 4	f 2 f f	18.3.	18,3 4		Couleu Saveur	29,5 : 3 disc-s r : 8-0	31,5 +1 M - P Mil Gr-Rs- m - a	3,6 Dim 1: - P -ov-ol Rg-N r - fo	: bov-cy dus ox - he	Compa l-fus inc erb	<u>cité</u>	: L - 11- C

dominalasion lasta dominal

N° d'ordre :

42 luntumlumb

Désignation :

faradisa 10 Rg s 531-535s.2

Emplacement :

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189/cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278/- sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 aranéeuses 202 - duveteuses 203/ - cotonneuses 204/ - sans villosité pubescente 280 / sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 /- autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 duveteux 2(8) - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 91

N° d'ordre :

4 Juntanlanta

Désignation :

Paradisa 10 R 90-531.5350.2

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

doutenheitecheitenheitenheitenb

A contour uni - anguleux - côtele. Glabre 242) - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253. dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256. Noeuds

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré 264 - vert 265).

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

-Calvo 94

Paradisa

N° d'ordre : Désignation :

duntumlanta

10 R9 s - 534 - 535 1.2

dentro hogi melantin dan turd

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 1(12) - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté -

aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 147 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 -

sans villosité pubescente 272 - sans villosité

laineuse 273.

limbe: glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité

laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-

ment bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 -

plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 -

partiellement rouge 165 - entièrement

rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 -

entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 -

sillon - partiellement - totalement. Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277, partiellement - totalement.

-Calvo 93

Formulaire de description 5/8

(maturité)

Année: 1999 Observateur:

Code cépage: Code clone:

Nom cépage: Paradisa Emplacement: 10R9 & 531-535

dinatas hartu alagtan harfard

```
Grappe
oiv 202 longueur: très courte (<10cm) 1 - courte (10-15cm) 3 - moyenne (15-20cm) 5)- longue
(20-30cm)(7) très longue (>30cm) 9.
oiv 203 largeur : très étroite (<5cm) 1 - étroite (5-10cm) 3 - moyenne (10-15cm) 5- large (15-
20cm) (7 ) très large (>20cm) 9.
oiv 204 compacité: très lâche 1 - lâche 3 - moyenne 5 - compacte 7) très compacte 9.
oiv 206 longueur pédoncule: très court (<2cm) 1 - court (2-4cm)(3)- moyen (4-7cm) 5 - long (7-
10cm) 7 - très long (>10cm) 9.
oiv 207 lignification du pédoncule : base seulement 1 - moitié 🕄 plus de la moitié 7
oiv 208* forme : cylindrique 1)- conique ou pyramidale 2.
oiv 209* présence d'un aileron : absent 1 - une aile 2 - deux ailes 3 - plus de deux ailes 4.
oiv 220 longueur: très courte (<8mm) 1 - courte (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm)(5)- longue
(20-26mm) 7- très longue (>26mm) 9.
oiv 221 largeur: très étroite (<8mm) 1 - étroite (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 large (20-
26mm) 7 - très large (>26mm) 9.
oiv 222 uniformité de la grosseur : non uniforme 1 - uniforme 3.
oiv 223 forme: aplatie 1 - arrondie 2 - elliptique 3 - ovoïde 4 - troncovoïde 5 - obovoïde 6 -
cylindrique 7 - arquée 8.
oiv 225 couleur épiderme : vert jaune 1 rose 2 - rouge 3 - gris 4 - rouge violet 5 - bleu noir 6
oiv 226 uniformité couleur épiderme : non uniforme 1 uniforme 2.
oiv 227 pruine: nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 228 épaisseur pellicule : très mince 1 - mince 3 - moyenne (5)- épaisse 7 - très épaisse 9
oiv 229 ombilic : peu apparent 1 - apparent 2)
oiv 230* coloration de la pulpe : non colorée 1)- colorée 2.
oiv 231 intensité coloration pulpe : non colorée (f)- coloration faible 3 - coloration moyenne 5 -
forte coloration 7 - très forte coloration 9.
oiv 232 succulence pulpe: peu juteuse 1 - juteuse(2.)
oiv 233 rendement en jus (ml / 100g baies) : faible (<65) 3 - moyen (65-75) 5 - élevé (>75) 7
oiv 235 fermeté pulpe : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - élevée 7 - très élevée 9
oiv 236 saveur : aucune 1) - goût muscat 2 - goût foxé 3 - goût herbacé 4 - goût spécial 5
oiv 236* saveur : aucune 1) - goût muscat 2 - goût foxé 3 - autre 4.
oiv 238 longueur pédicelle: très court (<4mm) 1 - court (4-8mm) 3) moyen (8-12mm) 5 - long
(12-16mm) 7 - très long (>16mm) 9.
 oiv 240 séparation du pédicelle : très facile 1 - facile 3 - moyen 5 - difficile 7 - très difficile 9
 oiv 241 présence de pépins : absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présents 3)
oiv 242 longueur pépins: très courts 1 - courts 3 - moyens 5 - longs 7 - très longs 9.
 oiv 243 poids d'un pépin (moyenne de 100 pépins secs) : très faible (<10mg) 1 - faible (25mg) 3 -
 moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (>65mg) 9.
 oiv 244 cannelures transversales face dorsale pépins : absentes (1) - présentes 2
```

Formulaire de description 6/8

(après chute des feuilles)

Année

44 duntandarita

Code clone : 0%

Observateur: FD

diminological material

Code cépage Nom cépage :

Paradisa

Emplacement: 10 89,1531.535

Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire 1 - elliptique 3 - aplatie 5

oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée &.

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre Ø - rouge violacé 3 - gris 4

oiv 104 lenticelles : absentes 1) - présentes 9

oiv 105 densité des poils dressés des noeuds : absence D- présence 9.

oiv 106 densité des poils dressés des entrenoeuds : absence D- présence 9.

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (<60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5 -

longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) D- moyen (11mm) 5 - grand

(14mm) 7 - très grand (>17mm) 9.

Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9

oiv 553 aptitude à la rhizogenèse : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

Vassal:

Noeuds: aplatis 1 - moyens 2) - saillants 3

H° d'ordre : Paradisa Emplacement: LO R9 A 531,535 : (1-(2)-3): 4-5-(6)Angle des nervures Sexe : 7-8-9 Li/L : (10)-(11) : 12 - (13) - (14) - 15 - 16 L2/L Nombre de lobes : 17 - 18 - (19) - (20) Prof. sinus latéral Sup. : (21) - (22) 23 - 24 Prof. sinus latéral Inf. : (25) - (26) -- 27 - 28 - 29 Forme sinus pétiolaire : 266 Fond sinus pét. ni en U ni en V : (267) Sinus pétiolaire ouvert Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 39 Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270 : 271 Sinus latéral Supérieur ouvert : (40) - (41) Dents : forme : 42 - (43) - (44) Dents (angle) : (45) - (46) - (47) Angle du lobe terminal Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 Nbre dents du point pét. à L3 : (60)- 61 - 62 Angle des nervures L3 L'3 : (63) - 64 - 65 - 66 - 67 Largeur du sinus pétiolaire Dent terminale du lobe latéral supérieur Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

dentro besterdenturlantend

+ 1 Juutuuluutu

Remar 96